



Sangrado Después del Parto: Lo Que Debe Saber

Cada parto es diferente, pero queremos que sepa que estamos listos para cuidarle en todo momento. Las personas pueden tener riesgo de sangrado durante o después del parto.

Avísele a alguien lo antes posible si presenta alguno de estos signos de Hemorragia Obstétrica (sangrado excesivo):

- Sangrado que empapa una toalla sanitaria o más por hora
- Coágulos de sangre del tamaño de un huevo o más grandes
- Si el sangrado ha aumentado
- Si tiene dolor
- Si no se siente bien, aunque no pueda explicar por qué



Qué esperar si el sangrado es un problema:

Si tiene mayor riesgo de sangrado, es posible que note lo siguiente:

- Más de una vía intravenosa (IV)
- Más personal en la habitación durante el parto
- Más pruebas y revisiones
- Más medicamentos y suministros en la habitación

También puede necesitar

- Medicamentos para ayudar a detener el sangrado
- Uso de aparatos médicos para ayudar a detener el sangrado
- Transfusión de sangre (recibir sangre de un donante)
- Procedimientos adicionales en el quirófano

Lo que estamos haciendo para mantenerle segura:

- Evaluaciones rutinarias del riesgo de sangrado
- Medición rutinaria de la cantidad de sangre perdida durante el parto
- Acceso rápido a sangre
- Acceso rápido a medicamentos
- Acceso rápido a suministros de emergencia
- Capacitación continua para médicos, enfermeras y personal

Díganos si necesita apoyo adicional.

¡Estamos aquí para usted!